

Topmast

Solução Intramamária

Uso Veterinário**Apresentação:**

Contém 21 seringas plásticas descartáveis com bico aplicador contendo 10 mL.

Fórmula:

Cada seringa de 10 mL contém:

Gentamicina (Sulfato)	150 mg
Cloridrato de Bromexina	50 mg
Veículo q.s.p.	10 mL

Indicações:

Tratamento das mastites agudas e crônicas dos bovinos, causadas por germes sensíveis à gentamicina, como: *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus agalactiae*, *Streptococcus dysgalactiae*, *Streptococcus uberis*, *E. coli*, *Pseudomonas* spp e *Enterococcus* spp.

Via de administração:

Intramamária nos bovinos em lactação.

Modo de usar:

Após a ordenha, instilar o produto no canal da teta, massagear cuidadosamente o úbere, para completa difusão do produto.

Dosagem:

150 mg de gentamicina + 50 mg de bromexina / teta, sendo: 1 seringa (10 mL) / quarto afetado / dia por até 3 dias.

ATENÇÃO - OBEDECER AO SEGUINTE PERÍODO DE CARÊNCIA

BOVINOS:

LEITE – O LEITE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER DESTINADO AO CONSUMO HUMANO 04 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. NESTE PERÍODO, O LEITE DEVE SER DESCARTADO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

Responsável Técnico: Roberto Popolim - Farmacêutico - CRF- SP: 40.577

Venda sob prescrição e aplicação sob orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Data de Vencimento: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Fabricante e Proprietário:

NOXON DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Rod. Anhanguera, km 296 - Jardim Industrial - CEP 14.140-000 - Cravinhos/SP
- Brasil

Tel.: 55 16 3951.9810 - CNPJ: 03.982.656/0001-45 - IE: 279.071.259-119

www.noxon.com.br

INDÚSTRIA BRASILEIRA

Telefone de Emergência – CEATOX/Hospital das Clínicas:

0800 0148 110 / 55 11 2661-8571