

Bi Atack

ABAMECTINA + FLUAZURON



Endectocida Pour On de Ampla Ação para Bovinos
Carrapaticida - Anti-Helmíntico - Bercicida

Solução Pour On

Uso Veterinário

Conteúdo: 1000 ou 5000 mL na forma Pour On (tópica).

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Fluazuron	3,00 g
Abamectina	0,60 g
Veículo (q.s.p.)	100,0 mL

INDICAÇÕES:

BI ATACK AF é indicado para uso Pour On, em bovinos, no tratamento e controle estratégico dos carrapatos (do gênero *Boophilus microplus*). Além disso, combate bernes (larvas de *Dermatobia hominis*) e moscas. Também é indicado para o tratamento de bovinos infectados por nematódeos gastrintestinais (*Haemonchus placei*, *Cooperia punctata*, *Oesophagostomum radiatum* e *Trichostrongylus axei*).

Nas provas oficiais realizadas a campo o produto apresentou eficácia superior a 95% até o 84º dia, contra carrapatos (do gênero *Boophilus microplus*).

MODO DE USO E DOSAGEM:

BI ATACK AF é administrado via Pour On (tópica), com aplicações na linha dorsal dos bovinos (fio do lombo) da região da cruz até a inserção da cauda, na dosagem de 10 mL para cada 100 kg de peso vivo. Para apresentação de 1000 mL a aplicação é feita com o próprio frasco do produto que já vem devidamente graduado, para apresentação de 5000 mL recomenda-se o uso de pistola dosadora.

A dosagem recomendada é de 10 mL para cada 100 kg de peso corporal, obedecendo à tabela abaixo:

PESO kg	DOSE mL
100	10
200	20
300	30
400	40
500	50

Para animais acima de 500 kg de peso corporal, seguir o padrão da dose 1 mL/10 kg de peso vivo.

Repetir a aplicação de acordo com orientação do Médico Veterinário tendo por base a infestação apresentada nos animais. Produto para aplicação em dose única.

ATENÇÃO - OBEDECER AOS SEGUINTE PERÍODOS DE CARÊNCIA

BOVINOS:

ABATE – O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS SOMENTE DEVE SER REALIZADO 66 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO.

LEITE – ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÊMEAS PRODUTORAS DE LEITE PARA CONSUMO HUMANO.

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTA BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESÍDUOS DO PRODUTO ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

CONTRAINDICAÇÕES:

- Não aplicar em animais exaustos, estressados, debilitados ou doentes.
- Não aplicar nas horas mais quentes do dia.

- Não aplicar em animais recém-manejados.
- Não aplicar em bezerros com idade inferior a 16 semanas.
- Não aplicar em regiões com lesões de pele.
- Não aplicar em vacas produtoras de leite para consumo humano.
- Não tratar os animais se estiverem molhados ou quando estiver prestes a chover.
- Produto indicado apenas para aplicação Pour On.
- Não aplicar o produto em outras espécies de animais.
- Não aplicar o produto em regiões sujas de lama ou estrume.

RECOMENDAÇÕES E PRECAUÇÕES:

- Não guardar ou aplicar o produto junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene ou domésticos.
- Obedecer às dosagens recomendadas para o uso do produto.
- Não utilizar o produto com prazo de validade vencido.
- Não fumar, comer ou beber quando estiver trabalhando com o produto.
- Não misturar com óleos e outros pesticidas.
- Após o trabalho com o produto, lavar bem as mãos e a parte exposta do corpo.
- Não contaminar rios e outros cursos de água.
- Se o produto atingir os olhos lavar com bastante água.
- Proteger a pele e olhos utilizando para tanto de equipamentos de proteção individual, durante o manuseio e aplicação do produto.
- Os frascos, após abertura, devem ser consumidos em até 90 dias.

REAÇÕES ADVERSAS / POSSÍVEIS EFEITOS COLATERAIS:

BI ATACK AF quando utilizado nas dosagens indicadas não provoca reações adversas.

INTOXICAÇÃO E SUPERDOSAGEM NOS ANIMAIS:

BI ATACK AF pode promover, nos casos de intoxicação por alta dosagem, depressão motora, aumento da taxa respiratória, tremores musculares, midríase e rigidez extensa. O tratamento deve ser sintomático. Não há antídoto.

INTOXICAÇÃO NO HOMEM:

Se ocorrer intoxicação acidental, proceder da seguinte maneira:

- Retirar as roupas contaminadas e lavar as partes atingidas do corpo, com água e sabão.

• Chamar o médico ou entrar em contato com o CEATOX/Hospital das Clínicas – USP (0800 0148 110 ou 55 11 2661-8571).

Outras Informações: Com base nos estudos realizados de Período de Carência do produto **BI ATACK AF**, a Abamectina apresenta um período de carência de 33 dias e o Fluazuron um período de 66 dias. Assim a carência para o abate foi determinada para 66 dias.

Venda sob prescrição e orientação do Médico Veterinário.

Conservar em local seco e fresco, ao abrigo da luz solar, fora do alcance de crianças e animais domésticos. Deve ser mantido em sua embalagem original.

Não utilizar embalagens vazias.



ATENÇÃO: ESTE MEDICAMENTO NÃO TEM INDICAÇÃO PARA USO HUMANO

Apresentação: Frasco plástico dosador contendo 1000 mL ou Frasco plástico contendo 5000 mL.

Data de Vencimento: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Fabricante e Proprietário:

NOXON DO BRASIL QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

Rodovia Anhanguera, km 296 - Jardim Industrial - CEP 14.140-000 - Cravinhos/SP - Brasil

Tel.: +55 16 3951.9810 - CNPJ: 03.982.656/0001-45 - IE: 279.071.259-119 www.noxon.com.br

Telefone de Emergência: CEATOX/HOSPITAL DAS CLÍNICAS:

0800 0148 110 / 55 11 2661.8571

INDÚSTRIA BRASILEIRA